

Barbara Pikulska¹, Romuald Mikusek²

¹Instytut Zoologiczny, 50-335 Wrocław, ul. Sienkiewicza 21.

e-mail: bpik@biol.uni.wroc.pl

²Park Narodowy Gór Stołowych, 57-350 Kudowa Zdr., ul. Słoneczna 31.

e-mail: mikusekr@polbox.com

FAUNA SSAKÓW Z TERENU ZIEMI KŁODZKIEJ NA PODSTAWIE ANALIZY ZRZUTEK PŁOMYKÓWKI

Zrzutki płomykówki zebrano w latach 1996-97, w miejscowościach: Dzikowiec, Czerwieńczycy, Wojbórz i Starków. Dzikowiec i Czerwieńczycy leżą w terenie podgórskim, u podnóża Gór Sowich i Gór Bardzkich na wysokości 480 i 400 m n.p.m. Wojbórz (380 m) zajmuje położenie w obniżeniu utworzonym pomiędzy Górami Bardzkimi a Garbem Golińca, Starków (370 m) zaś usytuowany jest w południowej części Kotliny Kłodzkiej.

Płomykówka jest gatunkiem stacjonarnym, który większość ofiar zdobywa w promieniu 1-2 km od gniazda. W Dzikowcu i w Czerwieńczycach w najbliższym otoczeniu stanowiska pola uprawne i łąki zajmują około 65% powierzchni, na lasy przypada około 30%. W Wojbórze udział lasów wynosi tylko 17%, pola i łąki stanowią zaś około 75%. Podobny jest sposób zagospodarowania terenu w Starkowie. We wszystkich badanych miejscowościach przepływają potoki i strumienie a teren poprzecinany jest licznymi rowami.

Na łączną liczbę 1702 przebadanych ssaków (Dzikowiec - 462 osobniki; Czerwieńczycy - 66; Wojbórz - 635; Starków - 529) znaleziono 18 gatunków: 7 należących do rzędu owadożernych, 1 z rzędu nietoperzy i 10 z rzędu gryzoni. Wśród gryzoni zaznacza się wysoki udział *Arvicolidae* (59-77%), z polnikiem jako gatunkiem dominującym (średnio 65,8%) oraz niewielki udział *Muridae* (tylko 10-16%). Taki skład ugrupowań *Micromammalia* jest charakterystyczny dla terenów południowo-zachodniej Polski, odwrotnie niż to ma miejsce na południowym wschodzie kraju, gdzie przeważają myszowate. Nie wykrycie w wyżej położonych stanowiskach, w Dzikowcu i w Czerwieńczycach myszy polnej zdaje się potwierdzać sugestię, że jest to gatunek nieliczny na terenach podgórskich południowo-zachodniej Polski. Udział *Insectivora* najwyższy był w Starkowie (24,5%) i w Czerwieńczycach (22,4%), gdzie panują warunki siedliskowe szczególnie sprzyjające tej grupie ssaków. Na pozostałych stanowiskach był dwukrotnie niższy.

Z gatunków mniej licznych lub o słabo zbadanym rozmieszczeniu wykryto nowe stanowiska rzęsorka mniejszego (*Neomys anomalus*) i ryjówki górskiej (*Sorex araneus*). Pierwszy z nich występował na 3 stanowiskach: w Dzikowcu (2 os.), Wojbórze (4 os.) i Starkowie (3 os.), drugi pochodzi z materiału ze Starkowa (1 os.). Stanowiska darniówki (*Pitymys subterraneus*) zlokalizowano w Czerwieńczycach, Wojbórze i Starkowie (razem 7 osobników) a badyłarki (*Micromys minutus*) nie znaleziono jedynie w Czerwieńczycach, prawdopodobnie ze względu na niewielką liczbę przebadanych okazów. Żebietek karliczek (*Crocidura suaveolens*) obecny był we wszystkich 4 analizowanych miejscowościach (16 osobników).