

25 IX 1982 w odległości 2 km na północ od Bystrzycy Kłodzkiej, na wyschniętym, położonym wśród łąk, bagnie porośniętym trzciną i turzycą, obserwowałem trzy cierliki /KF 1123/83/. Spośród trzech ptaków, jednego widziałem ze stosunkowo bliskiej odległości i oznaczyłem jako samicę. A oto spostrzeżone cechy rozpoznawcze. Ogólny ton ubarwienia przypominał trznadla /*Emberiza citrinella*/, ale w locie ptak robił wrażenie mniej krępego i ociężałego. W charakterystycznym rysunku głowy wyraźnie zaznaczał się szeroki, cytrynowy wąs, a także węższa i tego samego koloru brew, obejmujące razem szary policzek. Na podgardlu duża, jasno-żółta plama. Pierś rdzawożółta z wyraźnymi, długimi kreskami; na głowie słabiej zaznaczone kreski.

31 X 1982 w tym samym miejscu widziałem dwa cierliki /KF 1123/83/, z których dokładniej obserwowany był samcem. Udało się spostrzec ważniejsze cechy rozpoznawcze. Popielata obroża na piersi była szersza niż to przedstawia się w kluczach terenowych i posiadała kreskowanie. Po bokach ciała i u nasady skrzydeł występowało rdzawe zabarwienie. Bardzo wyraźne, pstre kreskowanie było widoczne również na plecach. W przypadku obu obserwacji dostrzegłem białe zabarwienie skrajnych sterówek. Lot ptaków i sylwetka były łądząco podobne do świergotka. W locie odzywały się monotonnym, wysokim "tsssi-ssi-ssi". Jest to trzecia obserwacja tego gatunku na Śląsku, a czwarta w Polsce /Tomiałojć 1972 oraz inf. ustna/.